

Laag- en Middencomplexe ambulancezorg

Onlangs is het kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg in de sector ingevoerd. Ook in onze regio wordt deze vorm van vervoer geïntroduceerd. Waar kan het team voor worden ingezet? Je ziet het in deze infographic.

Care of Cure?

Ambulancezorg kan sinds kort worden ingedeeld in laag-, midden- en hoog-complexe ambulancezorg. In de laag- en middencomplexe ambulancezorg (LMC) zijn de zorgvragen voornamelijk op care gebaseerd en minder op cure. Bijvoorbeeld het vervoer van stabiele patiënten van de ene ziekenhuislocatie naar de andere.











Situatie RAV

In onze regio wordt het LMC-team ingezet voor de laag- en middencomplexe ambulancezorg (de planbare ambulancezorg). De Advanced Life Support (ALS) teams zijn bevoegd om alle typen zorg te leveren, inclusief spoedeisende ambulancezorg. Dit wordt nu ook wel hoogcomplexe ambulancezorg genoemd.

	LMC is bevoegd voor:	ALS/HC is bevoegd voor:
Planbare ambulancezorg	Laagcomplex	Laagcomplex
	Middencomplex	Middencomplex
Spoedeisende ambulancezorg	-	Hoogcomplex
Acute psychiatrie	✓	✓

Handelingschema middencomplexe zorg







Hieronder volgen een aantal belangrijke handelingen die het MC-team op basis van het nieuwe kader mag verrichten. **Raadpleeg voor het complete overzicht het kwaliteitskader zelf.**

	Maken van een ECG (niet beoordelen)		Ritmebewaking		Zuurstoftoediening initiëren in afwachting van ALS-eenheid tot 6 ltr/min via neuskatheter/bril
	Mond-keel holte uitzuigen met yankauer		Tracheacanule basiszorg		Starten waakinфуus
	Initiëren pijnbestrijding paracetamol i.v. of fentanyl		Plaatsen venflon		Continueren doorlopende toediening i.v. antibiotica-, heparine-, morfine- en TPV toediening*

* Op voorwaarde dat dit tenminste de twee uur voorafgaande aan fysieke overdracht van de patiënt aan het ambulanceteam zonder bijwerkingen is gestart en waarbij de infusie-stand tijdens de inzet ongewijzigd kan blijven.

Uitsluitcriteria

De meldkamercentralist plant de middencomplexe zorgambulance **NIET**, in de volgende situaties in:

	Er is sprake van een voorwaardescheppende rit		De patiënt is jonger dan 6 jaar		De patiënt heeft (reële kans op) verloskundige problematiek
	De patiënt is 6-12 jaar en heeft monitorbewaking nodig		De patiënt heeft dreigende stoornissen van (een) vitale functie(s)		De patiënt krijgt intraveneuze medicatie toegediend, welke effect heeft op de haemodynamiek en korter dan twee uur voor aanvang vervoer is gestart.

Psychiatrie

Onze medewerkers zijn extra getraind in acute psychiatrie. Bij meldingen van verward gedrag kan de LMC-ambulance gestuurd worden.

Samenwerking Rapid Responder



Mocht een Rapid Responder bij een incident constateren dat er vervoer nodig is, dan heeft hij/zij afhankelijk van de situatie de mogelijkheid om een LMC-ambulance of ALS-eenheid aan te vragen bij de meldkamer.

Inzet bij reanimatiesituaties

De meldkamer kan een LMC-eenheid als first responder inzetten voor een (mogelijke) reanimatie, vooruitlopend op de inzet van een ALS-ambulance als de LMC- ambulance zich in de nabijheid bevindt.